

PERNEO EN ALPACAS

El único diagnóstico de gestación es la palpación externa “perneo”, que se efectúa en los últimos meses de preñez, cuando el feto ha alcanzado suficiente desarrollo para ser detectado. Por esta razón, las hembras con trastornos reproductivos no son detectadas y continúan en ese estado dentro de la explotación por años sucesivos, sin que se tomen medidas correctivas apropiadas y se constituye un factor limitante de la producción que conduce a serias pérdidas económicas. (Palomino 2012).

Como realizar el perneo en alpacas

1. El ayudante coge a la alpaca hembra con cuidado, este trabajo en corral cercado y pequeño
2. Se inmoviliza a la alpaca cogiendo el cuello y la cola
3. El técnico procede a la palpación con la alpaca parada y sujeta
4. Se desliza las manos por los dos lados del vientre suavemente
5. Luego las manos se desliza por el bajo vientre
6. Cuando la hembra está preñada se palpa y reconoce al feto fácilmente
7. Cuando después de varias revisiones no se distingue claramente el feto
8. Se procede a observar la vulva y los pezones, que deben estar desarrollados si esta preñada
9. En caso no está preñada la vulva y los pezones se muestran pálidos
10. Si a pesar de estas observaciones se tiene dudas
11. Se procede a tumbar con cuidado a la hembra y verificar con detalle
12. Si se observa el vientre vestigios de feto, la vulva y los pezones están hinchados, se puede decir que la hembra está preñada en sus primeros meses (Verdona) se deja en observación.
13. Si se observa el vientre flácido, la vulva y los pezones pálidos, y sin desarrollo la hembra no está preñada y se reconoce como vacía.
14. Se Pinta a las hembras vacías para retirarlas del grupo de preñadas antes de trasladar a las hembras preñadas a la cancha de parición.



Foto 1. Como proceder el perneo de alpacas