PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto
Geofísico del Perú - IGP

PALEO
TRACES

IRD Institut de Recherche
pour le Développement
FRANCE
Instituto francés de Investigación para el Desarrollo

GEOCIÊNCIAS
USP

Aplicaciones isotópicas en recursos hídricos

PhD. James Apaéstegui C.
Investigador Científico Superior
Instituto Geofísico del Perú.

japaestegui@igp.gob.pe

La hidrología a base de isótopos ambientales constituye un campo de investigación relativamente nuevo en el Perú.

Al observar e interpretar las características isotópicas se puede obtener información de alcance regional acerca del **origen, la renovación y el tiempo de tránsito del agua en el sistema considerado**, información que, con frecuencia, no es posible obtener por otros métodos.

Isótopos

Un **isótopo** es un átomo cuyo núcleo tiene el mismo número de protones pero diferente número de neutrones.

Hidrógeno ${}^1\text{H}$
1 protón
1 electrón

Deuterio ${}^2\text{H}$
1 protón
1 electrón
1 neutrón

Tritio ${}^3\text{H}$
1 protón
1 electrón
2 neutrones

Los isótopos ambientales de mayor interés hidrológico son:
Estables: Deuterio (D o H^2), Carbono-13 ($\delta^{13}\text{C}$), Oxígeno-18 ($\delta^{18}\text{O}$)
Radiactivos: Tritio (H^3) y Carbono-14. **C14**

Isótopos Estables

Isótopos de H y O constituyen trazadores geoquímicos ideales de las aguas, sus concentraciones no suelen alterarse por interacción con las materias de los acuíferos.

Isótopos de oxígeno

Fraccionamiento es el proceso donde un isótopo es favorecido durante un cambio de fase

$$\delta = \left[\frac{(^{18}\text{O}/^{16}\text{O})_{\text{amuestra}}}{(^{18}\text{O}/^{16}\text{O})_{\text{patrão}}} - 1 \right] \times 100\text{‰}$$

+ ↑ Enriquecido en ¹⁸O
- ↓ Empobrecido en ¹⁸O

Vienna Peedee Belemnite (VPDB)
Viena Standard mean ocean water. (VSMOW)

Los procesos naturales más importantes que hacen variar la composición isotópica estable de las aguas naturales son la evaporación y la condensación.

Procesos físico relacionados al fraccionamiento isotópico en el agua atmosférica.

Destilación Rayleigh

- **Efecto temperatura**
- **Efecto altitud**
- **Efecto continentalidad**
- **Efecto volumen de Lluva**
- **Efecto área fuente de lluvia**

Sudamerica: la señal isotopica del agua de lluvia esta influenciada por efectos del nivel de conveccion de la nube a traves de su paso por el continente.

El proceso de remoción continúa de isótopos pesados es conocido como destilación Rayleigh

Los valores más negativos en las zonas de altas altitudes e altas latitudes asociado al continuo empobrecimiento de las masas de aire debido a destilación Rayleigh asociada a caída de temperatura.

H₂O

Desde que la separación de los isótopos tanto en el H como el O ocurren en el mismo proceso sus proporciones en relación a 8.

Procesos en Equilibrio Isotópico

Procesos en fraccionamiento cinético.

Es posible verificar la recarga de acuíferos subterráneos por infiltración lateral a partir de ríos o de lagos, o por infiltración vertical de aguas estancadas, pues la composición isotópica de estas aguas difiere frecuentemente de la de las precipitaciones locales.

Determinación del área de recarga en función de la altura o de la distancia al mar.

Datos de GNIP /GNIR: Global Network for Isotopes in Precipitation and Rivers.

ated on the lower right of the map. The designations employed a

Aplicación para cuencas (Balance de masa, aportes de las fuentes)

- Subwatershed
- Glacier
- Elevation Band Delimiter
- Streamflow Measurement or Management Point

Agua subterránea
 $\delta^{18}O_s$

Agua de lluvia
 $\delta^{18}O_{pp}$

Agua del Glaciar
 $\delta^{18}O_g$

Agua de Escorrentía
 $\delta^{18}O_{ef}$

$$\delta^{18}O_{ef} = F1 (\delta^{18}O_{ef}) + F2 (\delta^{18}O_s) + F3 (\delta^{18}O_{pp}) + F4 (\delta^{18}O_g)$$

Agua de Escorrentía
 $\delta^{18}O_{ef}$

F1, F2, F3 y F4 son factores de ponderación de los aportes medidos en la cuenca.

Cosecha de aguas

QOCHA DE COSECHA

ETAPA 1: Inicio de lluvias

ETAPA 2: Pequeño cese de lluvias

ETAPA 3: Retorno de lluvias

QOCHA DE SIEMBRA

ETAPA 1: Inicio de lluvias

ETAPA 2: Pequeño cese de lluvias

ETAPA 3: Retorno de lluvias

QOCHA MIXTA

ETAPA 1: Inicio de lluvias

ETAPA 2: Pequeño cese de lluvias

ETAPA 3: Retorno de lluvias

Nombre	Lugar de Muestreo	Sector	δ2H Valor (permil)	δ18O Valor (permil)	Fuente de Muestreo	Distancia a LMM	Renovación de Aguas
E3	Baivilla 3	Alto Baivilla (sect 3)	-41.06	0.64	Qocha	6.97	Bajo
E19	Killiwara	Quelloyocpampa	-81.63	-5.98	Qocha	5.43	Moderado
E5	Kaccapincuyo	Caccapincuyillo	-101.34	-8.91	Qocha	4.97	Moderado
E20	Killihuara	Carpacarachi	-85.24	-7.84	Qocha	4.03	Moderado
E1	Baivilla 4	Alto Baivilla (sect 4)	-128.54	-15.07	Qocha	2.23	Medio
E7	Pampacolla	Morococca	-118.8	-13.91	Qocha	2.17	Medio
M2	Baivilla 4	Alto Baivilla (sect 4)	-132.72	-17.01	Manantial	0.82	Alto
M6	Kaccapincuyo	Caccapincuyillo	-138.1	-17.79	Manantial	0.72	Alto
M13	Jatunpuquio	Jatunpuquio	-135.62	-17.61	Manantial	0.59	Alto
M18	Carpacarachi No.5	Carpacarachi	-131.37	-17.23	Manantial	0.44	Alto
E22	Embalse Baivilla abajo	Baivilla	-131.09	-17.2	Qocha	0.43	Alto
M9	Pampachulla	Londorcocha	-139.11	-18.35	Manantial	0.29	Alto
M14	Cuchuypuquio	Laramani	-131.67	-17.96	Manantial	0.25	Alto
M17	Carpacarachi No.3	Carpacarachi	-132.47	-17.58	Manantial	0.23	Alto
M15	Riachuelo	Laramani	-142.93	-19.33	Manantial	0.21	Alto
M11	Baivilla	Laramani	-142.55	-18.91	Manantial	0.16	Alto
M23	Quebrada Baivilla	Baivilla abajo	-141.73	-18.82	Manantial	0.15	Alto
M8	Quebrada Alencastre	Alencastre	-146.67	-19.46	Manantial	0.12	Alto
M16	Carpacarachi No.4	Carpacarachi	-134.19	-17.92	Manantial	0.10	Alto
M24	Riachuelo Baivilla abajo	Baivilla abajo	-137.25	-18.5	Manantial	0.09	Alto
M21	Killihuara	Killihuara	-135.75	-18.14	Manantial	0.08	Alto
M4	Quebrada Tarzan	Pichihua	-143.7	-19.24	Manantial	0.03	Alto
E12	Millpo	Laramani	-142.62	-19.07	Qocha	0.01	Alto
M10	Baivilla	Laramani	-140.87	-18.86	Manantial	0.00	Alto

PACC, Cusco 2016

Andes del Perú = 90% de las formaciones kársticas de la cuenca Amazónica

Hydrogeology and Groundwater Management in Ica Peru

Preliminary results.....

- IHR5 436, Impresa Cultivares
- IHR5 973, Finca José Félix Ballejo
- IHR5 850, Villa Luz
- IHR5 12, Paraya de Santiago
- Salida del pozo de abastecimiento al Laguna Huacachina

- IHR5 296, Aguapueblo San Isidro
- IHR5 248, Cooperativa Paraiso

- Laguna Moron
- Lago Choclococha
- Laguna Huacachina, parte oeste
- Laguna Huacachina, parte este

- Chaplapa, anexo Ccotanca
- Chaplapa, Quebrada bajo nacimiento
- Chaplapa, zona Yaccasena

- Rio Pisco
- Rio Ica para el Valle de Ica

Preliminary results.....

Rainfall isotopes required.
 More data to understand
 the seasonal dynamics and
 recharges.

PERÚ

Ministerio del Ambiente

Instituto Geofísico del Perú - IGP

Estaciones	Altitud (msnm)
1. Estación Colán	62
2. Estación Piura	45
3. Estación Miraflores	30
4. Estación Morropón	144
5. Estación Chulucanas	95
6. Estación Coyoñas	1383
7. Estación Ayabaca	2700
8. Estación Huancabamba	1975
9. Estación Pomacochas	2257
10. Estación Palestina	870

Transecto de Piura

2016

Cluster means - Standard
362 backward trajectories
ECMG Meteorological Data

2017

Cluster means - Standard
368 backward trajectories
ECMG Meteorological Data

Aplicación para calibración de trazadores para estudios Paleoclimáticos

Bernasconi & McKenzie

Fig. 6. Oxygen isotope ($\delta^{18}\text{O}$) analysis of a *Prosopis* sample from Piura carried out at Laboratory of Tree-ring Research (LTRR), University of Arizona, USA. It shows isotopic variation along a 35mm long section from a 10-year old tree. There is a strong signal probably due to the ENSO event of 1997-98 (After Evans and Schrag, 2004).

Rodriguez et al., 2005

PERÚ

Ministerio del Ambiente

Instituto Geofísico del Perú - IGP

Clim. Past, 10, 1967–1981, 2014

www.clim-past.net/10/1967/2014/

doi:10.5194/cp-10-1967-2014

© Author(s) 2014. CC Attribution 3.0 License.

Hydroclimate variability of the northwestern Amazon Basin near the Andean foothills of Peru related to the South American Monsoon System during the last 1600 years

J. Apaéstegui^{1,3,4}, F. W. Cruz², A. Sifeddine^{3,4,12}, M. Vuille⁵, J. C. Espinoza^{1,6}, J. L. Guyot⁸, M. Khodri^{3,7}, N. Strikis², R. V. Santos⁹, H. Cheng^{10,11}, L. Edwards¹¹, E. Carvalho⁹, and W. Santini⁸

Contents lists available at ScienceDirect

Quaternary Science Reviews

journal homepage: www.elsevier.com/locate/quascirev

Holocene changes in monsoon precipitation in the Andes of NE Peru based on $\delta^{18}\text{O}$ speleothem records

M.G. Bustamante^{a,b,*}, F.W. Cruz^{a,b}, M. Vuille^c, J. Apaéstegui^{b,d}, N. Strikis^{a,e}, G. Panizo^f, F.V. Novello^a, M. Deininger^g, A. Sifeddine^{b,h}, H. Cheng^{i,j}, J.S. Moquet^a, J.L. Guyot^h, R.V. Santos^k, H. Segura^d, R.L. Edwards^j

Earth and Planetary Science Letters 494 (2018) 124–134

Contents lists available at ScienceDirect

Earth and Planetary Science Letters

www.elsevier.com/locate/epsl

Precipitation changes over the eastern Bolivian Andes inferred from speleothem ($\delta^{18}\text{O}$) records for the last 1400 years

James Apaéstegui^{a,b,*}, Francisco William Cruz^c, Mathias Vuille^d, Jens Fohlmeister^{e,f}, Jhan Carlo Espinoza^a, Abdelfettah Sifeddine^g, Nicolas Strikis^h, Jean Loup Guyotⁱ, Roberto Ventura^j, Hai Cheng^{k,l}, R. Lawrence Edwards^l

^a Instituto Geofísico del Perú, Lima, Perú

Publicaciones que permiten la articulación de distintos grupos de investigación.

Perspectiva regional de los cambios climáticos en el pasado.

Formación continua (Trabajos de tesis)

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA

“EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES ISOTÓPICOS EN LAS PRECIPITACIONES DE LA CUENCA DEL ALTO MAYO PARA SU APLICACIÓN EN LA HIDROLOGÍA”

Presentado por:

ANGELA AMPUERO GRÁNDEZ

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE:

INGENIERO AGRÍCOLA

Lima - Perú

2015

Algunas conclusiones del último reporte del Panel Inter gubernamental para el Cambio Climático.

It is *virtually certain* that orbital forcing will be unable to trigger widespread glaciation during the next 1000 years. Paleoclimate records indicate that, for orbital configurations close to the present one, glacial inceptions only occurred for atmospheric CO₂ concentrations significantly lower than pre-industrial levels. Climate models simulate no glacial inception during the next 50,000 years if CO₂ concentrations remain above 300 ppm. {5.8.3, Box 6.2}

Confidence in the link between changes in North Atlantic climate and low-latitude precipitation patterns has increased since AR4. From new paleoclimate reconstructions and modelling studies, there is *very high confidence* that reduced AMOC and the associated surface cooling in the North Atlantic region caused southward shifts of the Atlantic Intertropical Convergence Zone, and also affected the American (North and South), African and Asian monsoon systems. {5.7}

With *high confidence*, floods larger than those recorded since 1900 occurred during the past five centuries in northern and central Europe, western Mediterranean region and eastern Asia. There is *medium confidence* that modern large floods are comparable to or surpass historical floods in magnitude and/or frequency in the Near East, India and central North America. {5.5.5}

There is *high confidence* for droughts during the last millennium of greater magnitude and longer duration than those observed since the beginning of the 20th century in many regions. There is *medium confidence* that more megadroughts occurred in monsoon Asia and wetter conditions prevailed in arid Central Asia and the South American monsoon region during the Little Ice Age (1450 to 1850) compared to the Medieval Climate Anomaly (950 to 1250). {5.5.4 and 5.5.5}

PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto
Geofísico del Perú - IGP

- Los isotopos se consolidan con el tiempo como una poderosa herramienta para el estudio de sistemas hidro-climáticos tanto de escala local como regional y continental. Estas experiencias están brindando nuevos resultados y ayudando a conocer la dinámica de sistemas hidrológicos en el proceso del cambio climático tanto en escalas actuales como pasadas.
- Nuevas metodologías para estimaciones precisas de los aportes hídricos de las fuentes, podrán determinar el componente que ha sufrido mayor impacto. De esta manera se podrían plantear herramientas de gestión más eficientes en la conservación de los recursos.
- Solo a través de una adecuada red de monitoreo tanto de variables físico como químicas del agua y los suelos en la cuenca, se podrá contar con información que ayude correctamente en la toma de decisiones para el planeamiento del uso del recurso hídrico.

Gracias por su atención

japaestegui@igp.gob.pe

PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto
Geofísico del Perú - IGP

Understanding wetland sub-surface hydrology using geologic and isotopic signatures

P. K. Sikdar and P. Sahu

Department of Environment Management, Indian Institute of Social Welfare and Business Management,
 Kolkata 700073, India

Received: 5 February 2009 – Published in Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss.: 8 April 2009
 Revised: 24 June 2009 – Accepted: 19 July 2009 – Published: 28 July 2009

En un sistema acuático, sea superficial o subterráneo, la mezcla de aguas de diversas edades predomina, y las concentraciones de tritio se interpretan en función del tiempo medio de permanencia en un modelo matemático, consistente en una celda de mezcla o en una serie de dichas celdas consideradas aceptables desde el punto de vista geo-hidrológico.

Fig. 1. Location map of the area along with isotope monitoring

Aplicación de la señal isotópica como trazador de masas de aire.

Determinación del origen de las lluvias en el continente (Pacífico / Atlántico)

	~ 16° South			~ 18° South			Plateau Regions ~ 20° South		
	Abundance (%)	$\delta^{18}\text{O}$ (‰)	Prec (mm)	Abundance (%)	$\delta^{18}\text{O}$ (‰)	Prec (mm)	Abundance (%)	$\delta^{18}\text{O}$ (‰)	Prec (mm)
path 1	29.56	-10.84	14.65	21.87	-15.1	8.8	15.44	-13.94	9.72
path 2	17.90	-8.90	11.45	17.54	-10.38	8.58	17.72	-9.59	7.98
path 3	19.43	-8.77	10.03	19.70	-10.43	7.69	18.72	-9.95	9.05
path 4	33.11	-6.85	5	40.89	-7.85	3.64	48.07	-7.72	4.71

(a)

Los manantiales situados a altitud intermedia y elevada presentan una concentración relativamente alta del tritio y una amplia gama de composiciones isotópicas estables. La interpretación de esto es que el tiempo de tránsito del agua es corto y la mezcla escasa, lo que concuerda bien con la hidrogeología de la región. En cambio, en los grandes manantiales costeros la concentración del tritio es mucho menor, si bien la gama de composiciones isotópicas estables es similar. Esto indica que su origen es el mismo que el de los manantiales situados a gran altura, pero que el tiempo de tránsito es algo más largo. En los manantiales y pozos pequeños próximos a la costa oriental de la isla la concentración del tritio es parecida pero, al mismo tiempo, el contenido en isótopos pesados es algo mayor. Esto parece deberse a que las tierras de la parte oriental de la isla son algo más bajas

Fig. 6.10. Flow patterns and processes accompanying transformation of precipitation to runoff and newly formed groundwater. Reservoirs subject to selection by season are shown as rectangular boxes. Double arrows indicate fluxes subject to isotope fractionation (cf. Volume II).

TABLE 2-1 Radioactive Decay Used to Date Climate Records

Parent isotope	Daughter isotope	Half-life	Useful for ages:	Useful for dating:
Rubidium-87 (^{87}Rb)	Strontium-87 (^{87}Sr)	47 Byr	100 Myr	Granites
Uranium-238 (^{238}U)	Lead-206 (^{206}Pb)	4.5 Byr	>100 Myr	Many rocks
Uranium-235 (^{235}U)	Lead-207 (^{207}Pb)	0.7 Byr	>100 Myr	Many rocks
Potassium-40 (^{40}K)	Argon-40 (^{40}Ar)	1.3 Byr	>100,000 years	Basalts
Thorium 230 (^{230}Th)	Radon-226* (^{226}Ra)	75,000 years	<400,000 years	Corals
Carbon-14 (^{14}C)	Nitrogen-14* (^{14}N)	5,780 years	<50,000 years	Anything that contains carbon

*Daughter in this case is a gas that has escaped and cannot be measured.

Element	Uranium-238 series				Th-232 series		U-235 series	
Uranium	U-238 4.5*10 ⁹ y		U-234 245500 y				U-235 7.0*10 ⁸ y	
Protactinium		Pa-234 1.2 min						Pa-231 32800 y
Thorium	Th-234 24.1 d		Th-230 75400 y		Th-232 1.4*10 ¹⁰ y	Th-228 1.91 y	Th-231 25.5 h	Th-227 18.7 d
Actinium						Ac-228 6.1 h		Ac-227 21.8 y
Radium			Ra-226 1600 y			Ra-228 5.75 y	Ra-224 3.7 d	Ra-223 11.4 d
Francium								
Radon			Rn-222 3.8 d					
Astatine								
Polonium			Po-218 3.1 min	Po-214 0.00014 s				
Bismuth				Bi-214 19.9 min				
Lead			Pb-214 26.8 min	Pb-210 22.3 y	Pb-210 138 d		Pb-208 stable	Pb-207 stable

↓ α-decay
Z: -2
N: -4

↗ β-decay
Z: +1
N: +/-0

↓ decay series
of short-lived
nuclides

symbol of the
element

mass number

half-life

particle reactivity
 ■ low
 ■ intermediate
 ■ high